

Coléoptères Ténébrionidés de Larache et Oualidia (Maroc atlantique) : prospections de 2006 à 2009

Michel J. FAUCHEUX *

RÉSUMÉ : Cette liste des Coléoptères Ténébrionidés prospectés de 2006 à 2009, essentiellement dans les régions de Larache et Oualidia (Maroc atlantique), fait suite à une précédente liste établie de 1996 à 2006. Elle concerne surtout les captures effectuées à Larache dans le nord du Maroc. Elle complète la faune d'Essaouira, située plus au sud, par la découverte de *Clitobius ovatus salinicola* Wollaston 1861 (Opatrini).

MOTS-CLÉS : Coléoptère, Ténébrionidé, faunistique, région paléarctique occidentale, Larache, Oualidia, Essaouira, *Clitobius ovatus salinicola*.

ABSTRACT: Coleoptera Tenebrionidae from Larache and Oualidia (Atlantic coast of Morocco): prospections between 2006 and 2009.

This list of Coleoptera Tenebrionidae prospected between 2006 and 2009, largely (but not exclusively) in the regions of Larache and Oualidia (Western Morocco) follows a previous list drawn for the period 1996 to 2006. It involves essentially captures made in Larache in northern Morocco, and completes the fauna of Essaouira, situated further south, by the discovery of *Clitobius ovatus salinicola* Wollaston 1861 (Opatrini).

KEY WORDS: Coleoptera, Tenebrionidae, faunistic, Western Palearctic region, Larache, Oualidia, Essaouira, *Clitobius ovatus salinicola*.

INTRODUCTION

Une précédente liste des Coléoptères Ténébrionidés capturés de 1996 à 2006 sur la côte atlantique du Maroc a été établie (Fauchaux 2009). Le présent travail concerne des prospections ultérieures réalisées de 2006 à 2009 essentiellement dans la région de Larache, que nous avions peu étudiée jusqu'à présent, mais aussi à Oualidia et Essaouira (une capture).

Les insectes ont été déterminés en 2009 par Harold LABRIQUE, du Muséum d'histoire naturelle de Lyon.

RÉSULTATS

20 espèces ont été capturées, réparties en trois sous-familles.

I – SOUS-FAMILLE DES PIMELIINAE Latreille, 1802

Tribu des Erodiiini Billberg, 1820

1 – *Erodium externus* Fairmaire 1875 (s. str.)

Oualidia, plage de la lagune, 15/5/2009, 1 ex.

Essaouira-Diabat, plage niveau oued Ksob, 12/1/2006, 1 ex.

2 – *Erodium* sp. Indéterminé

Larache, sables de l'intérieur, 19/5/2009, 3 ex.

Tribu des Akidini Billberg, 1820

3 – *Akis elegans* Charpentier, 1825

Oualidia, karst au niveau du souk, 10/5/2009, 1 ex.

Tribu des Pimeliini Latreille, 1802

4 – *Pimelia* (s. str.) *laeviuscula* Kraatz, 1865

Oualidia, karst au niveau du souk, 15/5/2009, 3 ex.

karst au niveau de la « Forêt », 29/4/2009, 1 ex.

* Laboratoire d'Endocrinologie des Insectes Sociaux, Université de Nantes, Faculté des Sciences et des Techniques, 2 rue de la Houssinière, B.P. 92208, F-44322 NANTES Cedex 3, France. Courriel : fauchaux.michel@free.fr

- 5 – *Pimelia (s. str.) platynota*** Fairmaire, 1875
Larache, pinède côtière, 19/5/2009, 2 ex.
- 6 – *Pimelia (s. str.) echidna*** Fairmaire, 1875
Cap Bedouzza (anciennement Cap Cantin), 30 km au sud d'Oualidia, djebel, 18/9/2007, 1 ex.
- 7 – *Pimelia (s. str.) crenata*** Fabricius, 1798
Larache, sables intérieurs, 19/5/2009, 2 ex.
- 8 – *Pimelia (Amblyptera) rotundipennis*** Kraatz, 1865
Oualidia, villa lagune, 18/3/2007, 2 ex.
réramaie sud, 29/4/2009, 1 ex.
karst, niveau souk, 10/5/2009, 1 ex.
- 9 – *Pimelia (Amblyptera) scabrosa*** Solier, 1836
Oualidia, karst forêt, 29/4/2009, 2 ex.
karst souk, 15/5/2009, 3 ex
Larache, pinède côtière, 19/5/2009, 4 ex.
- 10 – *Pimelia (Amblyptera) rugosa*** Fabricius, 1782
Oualidia, dunes, 15/5/2009, 1 ex.
- 11 – *Ecphoroma hemisphaerica*** Solier, 1835
Larache, pinède côtière, 19/5/2009, 4 ex.
- Tribu des Tentyriini** Eschscholtz, 1831
- 12 – *Pachychila (s. str.) impunctata*** Fairmaire, 1860
Essaouira-Lazari, courant sur la dune à 16 h (H.U.), 16/3/2006, 1 ex.
- 13 – *Pachychila (s. str.) punctata (s. str.)*** Fabricius, 1798
Larache, pinède côtière, 19/5/2009, 3 ex.
- 14 – *Pachychila sp.*** Indéterminé
Larache, pinède côtière, 19/5/2009, 1 ex.
- 15 – *Eulipus subelegans*** Fairmaire, 1871
Oualidia, plage niveau « port des pêcheurs », 10/5/2009, 1 ex.
- 16 – *Tentyria (Subtentyrina) elongata ssp. subcostata*** Solier, 1835
Oualidia, dunes sud, 15/5/2009, 1 ex.
- II – SOUS-FAMILLE DES OPATRINAE** Laporte De Castelnaud, 1840
- Tribu des Opatrini** Brullé, 1832
- 17 – *Clitobius ovatus ssp. salinicola*** Wollaston, 1861
Essaouira, laisses de plage, 11/1/2006, 3 ex.
- III – SOUS-FAMILLE DES TENEBRIONINAE** Latreille, 1802
- Tribu des Scaurini** Billberg, 1820
- 18 – *Scaurus gigas*** Waltl, 1830
Oualidia, karst forêt, 16/10.2008, 1 ex.
karst forêt, 29/4/2009, 2 ex.

Tribu des Blaptini Leach, 1815

19 – *Blaps gigas* Linnaeus, 1767

Oualidia, rétamaie sud, 29/4/2009, 1 ex.

20 – *Blaps nitens ssp. medvedevi* Soldati, 2009

Oualidia, rétamaie sud, 9/9/2007.

CONCLUSION

À part *Clitobius ovatus ssp. salinicola* qui n'avait pas été déterminé dans une note précédente (Fauchaux 2009), les espèces ici mentionnées avaient été rencontrées soit à Essaouira, soit à Oualidia ou Tamri.

Concernant la nomenclature, il convient de signaler un changement : la sous-espèce *Blaps nitens ssp. barbara* Solier, 1848 [déjà observée à Oualidia : espèce 51, p. 175 in Fauchaux 2009] est désormais nommée *Blaps nitens ssp. medvedevi* Soldati, 2009 (Soldati *et al.* 2009). Cette sous-espèce a déjà eu plusieurs synonymes : *Blaps barbara* Solier, 1848 *sensu* Koch (1945) ; *Blaps sucata subsp. barbara* Solier, 1848 *sensu* Koch [1944] : *Blaps nitens subsp. barbara* Solier, 1848 *sensu* Ardoïn [1973]. Rappelons que nous avons déjà observé cette sous-espèce à Essaouira-Lazari en très grand nombre en septembre 2003 et dans la suaedaie d'Oualidia, au sud de la lagune, également en très grand nombre, en septembre 2006 (Fauchaux 2009). Selon Soldati *et al.* (2009), *B. nitens medvedevi*, dont l'holotype mâle a justement été décrit de Oualidia : « Kasbah Oualidia, Cap Cantin, 1.11.1948, Maroc (MNHN) », existe dans le SW du Maroc : Agadir, Boulaouane, « Cap Cantin » (actuellement Cap Bedouzza, à 30 km au sud d'Oualidia), Kasbah d'Oualidia, Casablanca, Fedala, Goulimine, Diabat (situé à 3 km au sud d'Essaouira), Essaouira (anciennement « Mogador »), Ifni, Marrakech, El Jadida (anciennement « Mazagan »), Smimou...

REMERCIEMENTS

Je remercie chaleureusement le Dr Harold LABRIQUE, Attaché de Conservation, Muséum d'histoire naturelle de Lyon, qui a réalisé toutes les déterminations et a relu le manuscrit.

BIBLIOGRAPHIE

- ARDOIN P. 1973. Contribution à l'étude des Tenebrionidae [Tenebrionidae] de Sardaigne. *Annales de la Société entomologique de France* 6 (2) : 77-140.
- FAUCHEUX M.J. 2009. Coléoptères Ténébrionidés du Maroc atlantique : Prospections de 1996 à 2006. Considérations morphologiques et écologiques. *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (nouvelle série)* Nantes 31 : 155-178.
- KOCH C. 1944. Tenebrionidae I. (I. Beitrage zur Kenntnis der iberischen Fauna. *Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft* 34 (1): 216-254.
- KOCH C. 1945. Über die Tenebrioniden der Gipfelfauna des Hohen und Mittleren Atlas Marokkos. Ergebnisse der Forschungsreise R. Paulian und A. Villiers nach dem Hohen Atlas Marokkos 1938. XIX. Beitrag. *Eos* 20 (3-4): 387-433.
- SOLDATI L., KERGOAT G.J. & CONDAMINE F. 2009. Important notes on taxonomic structure of *Blaps nitens* Laporte 840 with the description of new subspecies *Blaps nitens medvedevi* subsp. N. (Coleoptera: Tenebrionidae: Blaptini). *Caucasian Entomologica Bulletin* 5 (2): 231-233.
- SOLIER M. 1948. Essai de classification des Colaptérides Blapsites. Baudi F. & Truqui E. *Studi Entomologici* 1 : 1-376.